

ŚWIADOMA ZGODANA PRZEPROWADZENIE ZABIEGU KOREKTY KSZTAŁTU WARG SROMOWYCH/AUGMENTACJI PRZEDNIEJ ŚCIANY POCHWY Z UŻYCIEM KWASU HIALURONOWEGO

Imię, nazwisko

Rodzaj zabiegu/ lokalizacja:

Data zabiegu:

Wszystkie podane w niniejszym oświadczeniu informacje są objęte tajemnicą lekarską i służą jedynie trosce o Państwa bezpieczeństwo.

Informacja ogólna o kwasie hialuronowym i jego zastosowaniu :

Kwas hialuronowy jest substancją, która naturalnie występuje w organizmie człowieka w postaci soli sodowej (**hialuronianu sodu**). W najwyższym stężeniu występuje w skórze, w mazi stawowej oraz w cieple szklistym oka. Kwas hialuronowy jest również składnikiem płynów ustrojowych i tkanki łącznej. Stanowi także budulec ścian naczyń krwionośnych. Podstawową funkcją kwasu hialuronowego jest wiązanie wody. Wraz z wiekiem jego ilość stopniowo się zmniejsza, przez co dochodzi do degeneracji tkanek, w których się znajduje. Kwas hialuronowy występuje jako: usieciowany, częściowo usieciowany lub nieusieciowany. W zależności od stopnia usieciowania posiada różną gęstość oraz stopień wiązania cząsteczek wody, dzięki czemu wykazuje różną trwałość w zabiegach medycznych, w których został wykorzystany. Kwas hialuronowy usieciowany jest najbardziej odporny na enzym hialuronidazy, czyli rozbić kwasu hialuronowego. Wykorzystuje się go przede wszystkim do przywracania objętości twarży, wypełniania bruzd oraz tzw. wolumetrii. Kwas częściowo usieciowany stosuje się aby uzyskać efekt delikatnego wypełnienia. Z kolei kwas nieusieciowany, ze względu na bardzo dobre właściwości nawilżające stosuje się w przypadku skóry suchej, wiotkiej i zmęczonej

Opis przebiegu proponowanej procedury / zabiegu

Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym (nasiękowym lub przewodowym) ewentualnie w sedacji dożylniej.

Preparaty kwasu hialuronowego są wskazane do stosowania w następujących przypadkach:

W postaci śródskórnych wstrzyknień podawanych do środkowych lub głębokich warstw skóry właściwej w leczeniu odwodnienia i/lub łagodnej hipotrofii warg sromowych większych, w postaci wstrzyknień podskórnych lub wstrzyknień podawanych do głębokich warstw skóry właściwej w celu leczenia umiarkowanej lub ciężkiej hipotrofii warg sromowych większych.

W przednią ścianę pochwy celem augmentacji tej okolicy.

Preparat aplikujemy różnymi metodami za pomocą igły lub kaniuli. Po zabiegu mogą się pojawić drobne siniaczki lub delikatna opuchlizna. Zabieg nie wymaga rekonwalescencji. Opuchlizna jeśli występuje, to zanika po około jednym dniu, a siniaki mogą nam towarzyszyć jeszcze przez 3 do 7 dni.

Dalsza opieka pozabiegowa sprawowana jest ambulatoryjnie. Częstotliwość wizyt ustala lekarz opiekujący się Panią/Panem w poradni. Konieczna jest ścisła współpraca z lekarzem po zabiegu.

Powyższy opis dotyczy niepowikłanego i standardowego przebiegu zabiegu oraz okresu pozabiegowego.

Powinniście Państwo być świadomi, że zabieg jest zawsze związany z ryzykiem powikłań, zarówno tych wymienionych w dalszej części tej zgody, jak i innych, rzadziej występujących, trudnych do przewidzenia.

Dające się przewidzieć następstwa zabiegu i możliwe powikłania:

Mają najczęściej charakter przemijający, a do których należą:

- ✓ krwiaki, wybroczyny i siniaki w miejscu wkłucia,
- ✓ zaczerwienienie i obrzęk tkanek,
- ✓ zmiany w pigmentacji,
- ✓ zgrubienia, hyperkorekcja,
- ✓ asymetria, nierówności powierzchni
- ✓ zmiany grudkowo-krostkowe,
- ✓ nadwrażliwość i zmiany alergiczne

- ✓ infekcje w miejscu wklucia,
- ✓ uaktywnienie wirusa Herpes (wirus opryszczki)
- ✓ ziarniniaki, pokrzywka, torbiele

Czynniki zwiększające ryzyko powikłań ze strony pacjenta

Na ryzyko zabiegu mają wpływ stan ogólny chorego oraz choroby współistniejące oraz choroby przebyte. Na ryzyko infekcji, szczególnie narażenie są chorzy tuż po przebytych infekcjach, nosiciele bakterii (nos, gardło, zęby próchnicze, infekcje dróg moczowych, ginekologiczne, skory i paznokci).

Bliznowce pozabiegowe mogą tworzyć się u chorych ze skłonnościami do tego - blizny po wcześniejszych zabiegach. U chorych na cukrzycę istnieje większe ryzyko infekcji i gojenia rany pooperacyjnej. U chorych z osłabioną odpornością lub zażywających leki immunosupresyjne istnieje większe ryzyko infekcji.

Przeciwwskazania do zabiegu:

- zmiany skórne sromu wymagające wcześniejszej weryfikacji histopatologicznej,
- stan zapalny sromu,
- objawy przeziębienia,
- opryszczka,
- ciąża i karmienie piersią

Przygotowanie do zabiegu:

- przed zabiegiem należy wykonać badania krwi: grupa krwi, morfologia, układ krzepnięcia (APTT, PT, INR), glukoza na czczo, badanie ogólne moczu oraz inne badania zlecone w czasie konsultacji.
- W dniu zabiegu należy przyjść na czczo (6 godzin bez jedzenia i 2 godziny bez picia - mleko do kawy to też jedzenie)
- Około 7 dni przed zabiegiem należy odstawić leki zwiększające ryzyko krwawienia: warfin i pochodne, preparaty kwasu acetylosalicylowego (Aspiryna, Polopiryna, Acard)

- Ograniczyć spożywanie alkoholu i kawy na około 24h przed zabiegiem
- Pacjenci z cienką, pergaminową skórą i dużą tendencją do siniaczenia około 7 dni przed zabiegiem mogą przyjmować Rutinoscorbin, Cyclonamine w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia znacznego zasinienia po zabiegu
- Przed zabiegiem należy zgolić owłosienie okolicy łonowej

Pielęgnacja po zabiegu:

- Bezpośrednio po zabiegu prowadzenia samochodu jest przeciwwskazane.
- Częste podmywanie się pod bieżącą wodą i stosowania do podmywania się preparatu Tantum Rosa
- Pielęgnacja krocza preparatem odkażającym (np. Octanisept)
- Unikanie noszenia bielizny przez 2-3 dni po zabiegu
- Doraźne stosowanie ogólnodostępnych leków przeciwbólowych
- Zgłoszenie się do kontroli za około 7 dnia po zabiegu
- Powstrzymanie się od współżycia przez okres 6 tygodni
- Ból mogący pojawić się po zabiegu jest zwykle nieznaczny, pacjenci podają raczej wrażenie „ściągnięcia” i na ogół nie wymaga stosowania leków przeciwbólowych.
- Szwy skórne zdejmowanie są około 7 dni po zabiegu.
- W okresie około 3-4tyg. po zabiegu nie korzystamy z basenów, saun, kąpeli w naturalnych zbiornikach wodnych, nie przebywamy w pomieszczeniach o zwiększonym zapyleniu.

Możliwe postępowanie towarzyszące zabiegowi oraz okoliczności je uzasadniające:

W trakcie zabiegu może dojść do sytuacji wymagającej zastosowania dodatkowej procedury postępowania nie uzgodnionej przed zabiegiem z pacjentem.

- Wystąpienie komplikacji w trakcie zabiegu lub w okresie pozabiegowym może spowodować konieczność wykonania dodatkowych zabiegów, nie omawianych wcześniej z pacjentem.

- Dodatkowe leczenie w przypadku wystąpienia powikłań tzn. wykonanie dodatkowej procedury lub zastosowanie innego leczenia.
- Nawet kiedy ryzyko wystąpienia powikłań nie jest duże i dochodzi do nich rzadko, należy liczyć się z możliwością ich wystąpienia i zabiegami mającymi na celu poprawę ich wyniku.

Pytania pacjenta do rozmowy wyjaśniającej: Proszę wpisać wszystkie pytania jakie ma Pani/ Pan do lekarza.

.....
.....

Uwagi lekarskie do rozmowy wyjaśniającej : (Np. ryzyko indywidualne i możliwe komplikacje, postępowanie wtórne, specjalne pytania pacjenta, ograniczenie zgody co do transfuzji, możliwe skutki ujemne w przypadku odmowy lub przesunięcia terminu zabiegu, podstawy pacjenta do odmowy sposób dalszej opieki)

.....
.....

OŚWIADCZENIA PACJENTA:

- 1) Niniejszym oświadczam, że zgadzam się na przeprowadzenie w/w zabiegu. Biorę pod uwagę zarówno korzyści, jak również ryzyka związane z zabiegiem. Wyrażam zgodę na zastosowanie znieczulenia w trakcie zabiegu omówionego ze mną przez lekarza.
- 2) Zostałem(am) wyczerpująco poinformowany(a) o: przeciwwskazaniach do wykonania zabiegu, technice i metodzie przeprowadzania zabiegu, pochodzeniu i sposobie działania preparatów i urządzeń, które zostaną użyte do wykonania zabiegu, objawach jakie mogę wystąpić podczas i po zabiegu, przewidywanym okresie utrzymywania się rezultatów zabiegu, średniej ilości zabiegów, której wykonanie niezbędne jest do osiągnięcia i utrzymania efektów
- 3) Zostałem(am) poinformowany(a), że ilość zabiegów oraz ich efekty nie są identyczne dla każdego pacjenta i że uzależnione są od: postępowania pozabiegowego oraz indywidualnych predyspozycji.

- 4) Zostałem poinformowany, że notuje się indywidualne przypadki, w których osiągnięcie oczekiwanych efektów zabiegu jest niemożliwe oraz przyjmuję to ryzyko.
- 5) Jestem świadomy(a), że rozbieżność pomiędzy oczekiwanym przeze mnie efektem zabiegu a jego rzeczywistym efektem — mieszczącym się w granicach skali, o której zostałem uprzedzony, nie może być podstawą roszczeń odszkodowawczych.
- 6) Udzielono mi wyczerpującej informacji na temat wszelkich możliwych przewidzenia następstw i powikłań, jakie mogą wystąpić w związku z zabiegiem. Miałem możliwość zadawania pytań i uzyskałem na nie odpowiedzi. Powyższe ryzyko zabiegowe przyjmuję i nie będę z tego tytułu zgłaszać jakichkolwiek roszczeń.
- 7) Zostały mi przekazane zalecenia i wskazówki pielęgnacyjne do stosowania po wykonanym zabiegu, zapoznałem się z nimi i zobowiązuję się ich przestrzegać.
- 8) Informacja przekazana przez lekarza była rzetelna, wyczerpująca i jest dla mnie w pełni zrozumiała.
- 9) W razie wystąpienia niepokojących mnie objawów skontaktuję się z lekarzem wykonującym zabieg.
- 10) Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami, oświadczam, że nie zataiłem żadnych istotnych informacji dotyczących stanu mojego zdrowia. Oświadczam, iż zapoznałem/-em się z przeciwwskazaniami do zabiegu zawartymi w niniejszej ankiecie, a także omówionymi z lekarzem i potwierdzam, iż przeciwwskazania takie u mnie nie występują.
- 11) Wyrażam zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej przed zabiegiem oraz na każdej wizycie kontrolnej celem załączenia do karty pacjenta.

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z powyższym tekstem i wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na wykonanie zabiegu.

Otrzymałam zalecenia pozabiegowe.

.....
data i podpis lekarza

.....
data i podpis pacjenta